

Н. А. Кароль

## КРИТЕРИЙ НАЛИЧИЯ ТАКОГО ЦИКЛА, ЧТО МНОЖЕСТВО НЕ ВХОДЯЩИХ В НЕГО ВЕРШИН НЕЗАВИСИМО

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о поиске гамильтонова цикла в графе очень известный и уже хорошо исследован. Помимо классических критериев Дирака и Оре, устанавливающих наличие гамильтонова цикла ограничением на степени вершин графа, стоит упомянуть изложенные в книге Бонди и Мурти [1] теоремы Хватала, дающие критерии гамильтоновости графа на языке его вершинной связности, его замыкания и степенных последовательностей графа. Наряду с этими результатами, ещё есть вопрос о гамильтоновости степеней графа, и здесь есть классические результаты: знаменитая теорема Флейшнера о гамильтоновости квадрата двусвязного графа (изложенная в книге Дистеля [2]) и теорема Чартранда и Капура о гамильтоновости куба связного графа.

Что касается проблемы поиска длинных циклов, сперва приведём классическую теорему Линиала [3], содержащую оценку на длину наибольшего простого цикла в двусвязном графе и дополняющую многочисленные результаты о гамильтоновых циклах, и, в частности, из которой идейно выросла наша работа.

**Теорема** (N. Linial, 1975). Пусть  $G$  — двусвязный граф, а

$$m = \min_{xy \notin E(G)} d_G(x) + d_G(y).$$

Тогда длина наибольшего простого цикла графа  $G$  не менее, чем  $\min(m, v(G))$ .

Статья Томассена [4] содержит, в числе прочих, критерий наличия в планарном графе цикла со специальным условием: все вершины, не входящие в цикл, должны быть независимыми. Наша работа содержит критерий наличия такого цикла в терминах минимальной степени вершин графа.

---

*Ключевые слова:* независимое множество, двусвязный граф, минимальная степень, длинный цикл.

**Теорема.** Пусть  $G$  — двусвязный граф,  $v(G) = n$  и  $\delta(G) \geq \frac{n+2}{3}$ . Тогда в  $G$  найдётся такой простой цикл, что множество не входящих в него вершин является независимым.

## 2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОСНОВНОГО РЕЗУЛЬТАТА

В доказательстве будем ссылаться на следующую классическую лемму, которая используется в доказательствах критерия Оре и разных теорем Хватала.

**Лемма 1.** Пусть  $m > 2$ ,  $u_1 \dots u_m$  — максимальный путь в графе  $G$ , причём  $d_G(u_1) + d_G(u_m) \geq m$ . Тогда в графе  $G$  есть цикл длины  $m$ .

**Доказательство теоремы** длинное, для удобства выделены 5 утверждений.


С самого начала отметим, что почти везде в доказательстве мы будем пользоваться оценкой  $\delta(G) \geq \frac{n}{3}$  и только в паре мест воспользуемся оценкой  $\delta(G) \geq \frac{n+2}{3}$ .

От противного, пусть существует граф, удовлетворяющий всем условиям, но в нём нет такого цикла, что не входящие в него вершины образуют независимое множество.

Сначала разберём случай  $n < 6$ . В силу двусвязности,  $\delta(G) \geq 2$ . Если  $n = 3$  или  $n = 4$ , то очевидно из  $\delta(G) \geq 2$  следует, что граф имеет цикл, и он подойдёт, множество не входящих в него вершин будет независимо, поскольку оно или пустое или состоит из одной вершины. Если  $n = 5$ , то граф опять же имеет цикл. Если он длины 4 или 5, то аналогично он нам подходит. Если он длины 3, то обозначим его вершины  $r_1, r_2, r_3$ . Обозначим остальные вершины  $r_4, r_5$ . Если  $r_4 r_5 \notin E(G)$ , то цикл  $r_1 r_2 r_3$  подходит под все условия. Иначе,  $r_4 r_5 \in E(G)$ . Поскольку граф связный, то есть ребро между множествами вершин  $\{r_1, r_2, r_3\}$  и  $\{r_4, r_5\}$ , не теряя общности, пусть  $r_1 r_4 \in E(G)$ . Поскольку граф двусвязный, то после удаления  $r_1$  граф остаётся связным, значит, есть ребро между множествами вершин  $\{r_2, r_3\}$  и  $\{r_4, r_5\}$ . Пусть конец этого ребра —  $r_4$ , не теряя общности,  $r_2 r_4 \in E(G)$ . Тогда есть подходящий нам цикл длины 4 — это  $r_1 r_4 r_2 r_3$  (рис. 1а). Если же конец этого ребра — это  $r_5$ , не теряя общности,  $r_2 r_5 \in E(G)$ , то тогда есть подходящий нам цикл длины 5 — это  $r_1 r_4 r_5 r_2 r_3$  (рис. 1б).

Отныне считаем, что

$$n \geq 6. \quad (1)$$

Рис. 1. Иллюстрация разбора случая  $n = 5$ .

Проделаем с графом следующую процедуру: пока можем, добавим какое-то ребро в граф, если все вышеупомянутые свойства (двусвязность, минимальная степень и отсутствие такого цикла, что не входящие в него вершины образуют независимое множество) после добавления ребра остаются (условия про двусвязность и минимальную степень, конечно, от добавления ребра не нарушатся). Если же какое-то ребро в граф добавить не можем, то останавливаем процедуру. Для простоты, чтобы не вводить новых обозначений, будем считать, что граф  $G$  – это и есть тот граф, который получили после остановки процедуры. Значит, граф  $G$  обладает такими свойствами:

а)  $G$  двусвязный.

б)  $\delta(G) \geq \frac{n}{3}$ .

в) Для любых  $d_1, d_2 \in V(G)$  таких, что  $d_1 d_2 \notin E(G)$  выполнено следующее свойство: существует такой путь между  $d_1$  и  $d_2$ , что не входящие в него вершины независимы.

Условие в) образуется как раз после того, как закончили процедуру. Действительно, если условие в) не выполнено, то это значит, что перед окончанием процедуры мы могли добавить какое-то ребро согласно процедуре, а значит, процедура не была завершена.

**Утверждение 1.** *В  $G$  есть гамильтонов путь.*

**Доказательство.** Будем доказывать от противного. Рассмотрим в графе такой самый длинный путь из тех, что его концы не соединены, и что не входящие в него вершины образуют независимое множество




Рис. 2. Если  $z_t$  - красная вершина, а  $z_{t-2}$  - зелёная, и если  $N_G(z_{t-1}) \subseteq L_0$ , то тогда цикл  $z_1, z_2, \dots, z_{t-2}, z_k, z_{k-1}, \dots, z_t$  (на рисунке обозначен жирным) подходит.

(условие в) гарантирует, что такие пути есть). Обозначим этот путь как  $L_0$ . Пусть он не является гамильтоновым, значит, в нём  $k < n$  вершин. Пронумеруем их в порядке обхода пути:  $z_1, z_2, \dots, z_k$ . Будем говорить, что вершина  $z_i$  находится *справа* от вершины  $z_j$ , если  $i > j$ , и *слева*, если  $i < j$ . Также назовём вершину *красной*, если она — сосед  $z_1$  и назовём вершину *зелёной*, если она — сосед  $z_k$  (никаких проблем с совмещением цветов нет: например, вершина может быть и красной, и зелёной одновременно). Очевидно, что все красные и зелёные вершины лежат в пути  $L_0$ , поскольку иначе путь  $L_0$  можно было бы удлинить за счёт красной или зелёной вершины, не лежащей в нём, а оставшееся множество вершин останется независимым. Значит, поскольку  $d_G(z_1), d_G(z_k) \geq \frac{n}{3}$ , то зелёных и красных вершин в пути  $L_0$  не менее, чем по  $\frac{n}{3}$ .

Заметим, что никакая красная вершина не может быть соседней через 1 справа от зелёной вершины, то есть для  $\forall t$ : если  $z_t$  — красная вершина, то  $z_{t-2}$  не может быть зелёной. От противного: пусть такая ситуация возможна. Рассмотрим множество  $N_G(z_{t-1})$ . Если  $N_G(z_{t-1}) \subseteq L_0$ , то тогда образуется цикл длины  $k - 1$  (рис. 2). Не входящие в этот цикл вершины — это все не входящие в  $L_0$  вершины (это независимое

множество) и вершина  $z_{t-1}$ . Но поскольку  $N_G(z_{t-1}) \subseteq L_0$ , то вершина  $z_{t-1}$  не имеет соседей среди не входящих в  $L_0$  вершин, а значит, нашёлся такой цикл, что не входящие в него вершины образуют независимое множество. Если же  $N_G(z_{t-1}) \not\subseteq L_0$ , то обозначим не входящую в  $L_0$  вершину, являющуюся соседом  $z_{t-1}$ , через  $h$ . Тогда мы нашли путь длины  $k + 1$ , что не входящие в него вершины независимы:  $z_1 z_2 \dots z_{t-2} z_k z_{k-1} z_{k-2} \dots z_t z_{t-1} h$  (рис. 3) – пришли в противоречие с предположением, что  $L_0$  – самый длинный такой путь, что остальные вершины независимы. Множество не входящих в него вершин независимо, потому что это множество не входящих вершин в  $L_0$  (а оно независимо) без вершины  $h$ .




Рис. 3. Если  $z_t$  - красная вершина, а  $z_{t-2}$  - зелёная, и если  $N_G(z_{t-1}) \not\subseteq L_0$ , то тогда есть такой путь (на рисунке обозначен жирным), что он длиннее  $L_0$  и вершины, не входящие в него, независимы.

Поскольку путь  $L_0$  не гамильтонов, то  $k < n$  и существует вершина  $y \notin L_0$ . Поскольку не входящие в путь  $L_0$  вершины образуют независимое множество, то  $N_G(y) \subset V(L_0)$ . Обозначим  $\mu = |N_G(y)|$  и назовём вершину  $z_t$  *чёрной*, если  $z_{t+1}y \in E(G)$  (то есть вершина *чёрная*, если она – сосед слева в порядке обхода пути  $L_0$  какого-то соседа  $y$ ). Поскольку  $\delta(G) \geq \frac{n}{3}$ , то  $\mu \geq \frac{n}{3}$ , а количество чёрных вершин не менее, чем  $\mu$  (чёрных вершин столько же, сколько соседей  $y$ , поскольку  $z_1$  не может быть соседом  $y$ , иначе путь  $L_0$  можно было бы очевидно удлинить от  $z_1 \dots z_k$  до  $yz_1 \dots z_k$  с сохранением условия про независимость оставшихся вершин).

Также понятно, что чёрная вершина не может быть зелёной (рис. 4).




Рис. 4. Если  $z_t$  - чёрная и зелёная, то тогда  $z_{t+1}y, z_t z_k \in E(G)$ . Тогда путь (обозначен жирным на иллюстрации)  $z_1 z_2 \dots z_t z_k z_{k-1} \dots z_{t+1} y$  длины  $k + 1$ , и не входящие в него вершины образуют независимое множество. Противоречие с выбором  $L_0$ .

Сложим вместе все факты про цвета вершин, которые мы поняли:

- 1) Чёрных, красных и зелёных вершин хотя бы по  $\frac{n}{3}$ .
- 2) Красные могут быть зелёными, но чёрные не могут быть зелёными.
- 3) Красные не могут быть соседними через 1 от зелёных справа.

Будем называть вершину  $z_t$  *блокированной*, если  $z_{t+2}$  - это красная вершина. Из факта 3) сразу ясно, что блокированные вершины не могут быть зелёными. Также заметим, что блокированные вершины не могут быть чёрными. Действительно, иначе, пусть  $z_t$  - блокированная чёрная вершина. Тогда  $z_{t+1}y \in E(G)$ , а  $z_{t+2}$  - красная вершина, то есть  $z_1 z_{t+2} \in E(G)$ . Тогда путь  $yz_{t+1}z_t z_{t-1} \dots z_1 z_{t+2} z_{t+3} \dots z_k$  длиннее пути  $L_0$ , а множество остальных вершин независимо (это аналогично тому, что происходит на рис. 4). Заметим, что множество блокированных вершин содержит хотя бы  $\frac{n}{3} - 1$  вершины. Действительно, каждая красная вершина (а их хотя бы  $\frac{n}{3}$ ) порождает блокированную по определению, кроме вершины  $z_2$  ( $z_1$  - не красная, поскольку не является соседом самой себе).

Таким образом, три множества {блокированные вершины}, {чёрные вершины}, {зелёные вершины} - попарно непересекающиеся и имеют мощности не менее, чем  $\frac{n}{3} - 1$ ,  $\frac{n}{3}$ ,  $\frac{n}{3}$  соответственно. Поскольку эти 3 множества являются подмножествами  $z_1, \dots, z_{k-1}$  (очевидно,  $z_k$  не

является ни блокированной, ни чёрной, ни зелёной), значит,  $k - 1 \geq \frac{n}{3} - 1 + \frac{n}{3} + \frac{n}{3} = n - 1$ . Но  $k < n$ , поскольку предположили, что путь негамильтонов. Противоречие.  $\square$

Итак, в  $G$  есть гамильтонов путь. Обозначим его вершины в порядке обхода этого гамильтонова пути:  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Аналогично предыдущему, будем говорить, что вершина  $x_i$  находится *справа* от вершины  $x_j$ , если  $i > j$ , и *слева*, если  $i < j$ . Поскольку  $d_G(x_1) \geq \frac{n}{3}$ , то существует такой индекс  $i \geq \frac{n}{3} + 1$ , что  $x_1 x_i \in E(G)$ . Заметим, что вершины  $x_1 x_2 \dots x_i$  (в таком порядке обхода) образуют цикл, а все остальные вершины  $x_{i+1} x_{i+2} \dots x_n$  образуют путь (в таком порядке обхода) (рис. 5). Таким образом выполнено утверждение: в графе  $G$  есть такой цикл длины не менее  $\frac{n}{3} + 1$ , что все остальные вершины образуют путь.




Рис. 5. В графе  $G$  есть цикл  $x_1 x_2 \dots x_i$ , для которого все не входящие в него вершины образуют путь  $(x_{i+1} x_{i+2} \dots x_n)$ .

Пусть  $r$  – наибольшее такое число, что существует такой цикл длины  $r$  (обозначим этот цикл через  $T$ ), что все остальные вершины образуют путь (обозначим этот путь через  $H$ ). Только что доказали, что  $r \geq \frac{n}{3} + 1$ . В цикле  $T$  всего  $r$  вершин, значит, в пути  $H$  всего  $n - r$  вершин, и в этом пути  $n - r - 1$  рёбер (рис. 6).

**Утверждение 2.**  $r \geq \frac{n}{2}$ .

**Доказательство.** От противного, пусть  $r < \frac{n}{2}$ . Обозначим через  $x_{\alpha_1}, \dots, x_{\alpha_f}$  соседей  $x_1$  и через  $x_{\beta_1}, \dots, x_{\beta_g}$  соседей  $x_n$ . Поскольку  $\delta(G) \geq \frac{n}{3}$ , то  $f \geq \frac{n}{3}$  и  $g \geq \frac{n}{3}$ . Заметим, что для любых  $1 \leq i \leq f$  и  $1 \leq j \leq g$  выполнено, что  $\alpha_i - 1 \neq \beta_j + 1$ , потому что иначе образуется цикл длиной  $n - 1$  (он содержит все вершины, кроме  $x_{\alpha_i - 1} = x_{\beta_j + 1}$ , то есть он такой:  $x_1 x_2 \dots x_{\beta_j} x_n \dots x_{\alpha_i}$ ), он подходит под то, что ищем, поскольку




Рис. 6. Вершины графа  $G$  разбиваются на 2 непересекающиеся группы: цикл  $T$  и путь  $H$ .

не входящие в него вершины (а это одна вершина) независимы. Также заметим, что для любых  $1 \leq i \leq f$  и  $1 \leq j \leq g$  выполнено, что  $\alpha_i < \frac{n}{2}$  и  $\beta_j > \frac{n}{2}$  (иначе очевидно образуется нужный цикл длины не менее  $\frac{n}{2}$ , такой, что все остальные вершины образуют путь: он проходит по рёбрам пути  $H$  и ребру  $x_1x_{\alpha_i}$  (или  $x_{\beta_j}x_n$ ) соответственно). Рассмотрим вершину  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$ . Только что доказали, что она правее всех соседей  $x_1$  и левее всех соседей  $x_n$ . Заметим, что для любых  $1 \leq i \leq f$  и  $1 \leq j \leq g$  выполнено, что  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}x_{\alpha_i-1} \notin E(G)$  и  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}x_{\beta_i+1} \notin E(G)$  (иначе образуется такой цикл длиной не менее  $\frac{n}{2}$ , что все остальные вершины образуют путь: рис. 7а и 7б соответственно). Поскольку все вершины  $x_{\alpha_i-1}$  и  $x_{\beta_i+1}$  различны, то это означает, что  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$  не соединена с не менее, чем  $\frac{2n}{3}$  этими различными вершинами, с собой не соединена тоже. Всего вершин  $n$ , значит, выходит, что  $d_G(x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}) \leq \frac{n}{3} - 1$ . Противоречие с тем, что  $\delta(G) \geq \frac{n}{3}$ .  $\square$

Вернёмся непосредственно к доказательству теоремы и рассмотрим 2 случая.






Рис. 7. Если  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} x_{\alpha_i-1} \in E(G)$  или  $x_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} x_{\beta_i+1} \in E(G)$ , то тогда найдётся цикл (отмечен жирным) длины не менее  $\frac{n}{2}$ , что все остальные вершины образуют путь.

**1 случай:** *Существуют две такие разные вершины цикла  $T$ , что одна соединена с одним концом пути  $H$  (обозначим его  $a$ ), а другая - с другим концом пути  $H$  (обозначим его  $b$ ).*

Пусть  $\rho_a$  вершин в цикле  $T$  соединены с вершиной  $a$ , но не с вершиной  $b$  (назовём такие вершины *вершинами типа  $a$* ) и пусть  $\rho_b$  вершин в цикле  $T$  соединены с вершиной  $b$ , но не с вершиной  $a$  (назовём такие вершины *вершинами типа  $b$* ) и, наконец, пусть  $\rho_{ab}$  вершин в цикле  $T$  соединены с вершинами  $a$  и  $b$  (назовём такие вершины *вершинами типа  $ab$* ). Сразу из определения выведем пару простых свойств. Во-первых, никакая вершина цикла  $T$  не может быть сразу двух типов, но может быть ни одного из этих типов (если не соединена ни с  $a$ , ни с  $b$ ). Во-вторых, никакие вершины одинакового типа не являются соседними по порядку обхода цикла (иначе цикл можно было бы удлинить за счёт вершины  $a$  или вершины  $b$ , а оставшиеся вершины образуют путь, или же существует гамильтонов цикл (рис. 8)).

Заметим, что не может быть таких двух разных вершин цикла  $T$ , что одна соединена с  $a$ , другая - с  $b$ , и между этими вершинами расстояние по рёбрам цикла  $T$  не более  $n - r$ . Действительно, пусть есть такие. Тогда заметим, что найдётся цикл (он идёт по рёбрам большей половины цикла  $T$  между этими вершинами, концы вершин соединены с  $a$  и  $b$  соответственно, и по пути  $H$ , рис. 9), такой, что множество не входящих в него вершин образует путь, а количество не входящих в него вершин не более, чем  $n - r - 1$ . Тогда количество вершин в этом цикле не менее, чем  $r + 1$ . Противоречие с определением  $r$ : мы нашли цикл, подходящий под все условия для цикла в определении  $r$ , но большего размера.




Рис. 8. Если конец пути  $H$  (на рисунке - вершина  $b$ ) соединён с двумя подряд идущими вершинами в порядке обхода цикла  $T$ , то цикл  $T$  можно было бы удлинить за счёт этого конца, а оставшиеся вершины образуют путь. Противоречие с выбором цикла  $T$ .




Рис. 9. Если одна из двух разных вершин цикла  $T$  соединена с  $a$ , а другая с  $b$ , и расстояние между этими вершинами по рёбрам цикла  $T$  (на рисунке - нежирные рёбра) не более  $n - r$ , то тогда есть другой цикл (на рисунке обозначен жирным), из которого следует противоречие с определением  $r$ .

Значит, если есть такие 2 разные вершины разных типов (или же обе типа  $ab$ ) цикла  $T$ , что одна соединена с  $a$ , а другая - с  $b$ , то тогда между ними расстояние по рёбрам цикла  $T$  не менее, чем  $n - r + 1$ .

Разберём 2 подслучая.

**Подслучай 1а:** В цикле  $T$  нет вершин типа  $a$  и нет вершин типа  $b$ .

То есть в цикле  $T$  каждая вершина или соединена и с  $a$ , и с  $b$ , или же не соединена ни с  $a$ , ни с  $b$ . Значит,  $\rho_a = \rho_b = 0$ . Тогда, по формулировке случая 1, в рамках которого находимся, получаем, что  $\rho_{ab} \geq 2$ .

Вершина  $a$  соединена только с  $\rho_{ab}$  вершинами цикла  $T$  и может быть ещё соединена только с вершинами пути  $H$ , не включая себя, то есть всего она соединена не более, чем с  $\rho_{ab} + n - r - 1$  вершинами. Поскольку  $\delta(G) \geq \frac{n+2}{3}$ , получаем, что  $\rho_{ab} + n - r - 1 \geq \frac{n+2}{3} \Rightarrow \frac{2n-5}{3} + \rho_{ab} \geq r$ .

Поскольку между любыми двумя вершинами типа  $ab$  расстояние по рёбрам цикла  $T$  не менее, чем  $n - r + 1$ , то в цикле  $T$  не менее, чем  $\rho_{ab}(n - r + 1)$  рёбер. Поскольку в цикле  $T$  ровно  $r$  рёбер, то получаем, что  $r \geq \rho_{ab}(n - r + 1) \Rightarrow (\rho_{ab} + 1)r \geq \rho_{ab}(n + 1)$ . Оценивая  $r$  в этом неравенстве оценкой из предыдущего абзаца, получаем, что

$$\begin{aligned} (\rho_{ab} + 1)\left(\frac{2n-5}{3} + \rho_{ab}\right) &\geq \rho_{ab}(n+1) \Rightarrow \frac{2n-5}{3}\rho_{ab} + \frac{2n-5}{3} + \rho_{ab}^2 \geq n\rho_{ab} \\ &\Rightarrow 3\rho_{ab}^2 - 5\rho_{ab} - 5 \geq (\rho_{ab} - 2)n. \end{aligned}$$

Заметим, что если  $\rho_{ab} = 2$ , то это неравенство очевидно не выполняется. Тогда, поскольку  $\rho_{ab} \geq 2$ , получаем, что  $\rho_{ab} \geq 3 \Rightarrow \rho_{ab} - 2 > 0$ . А тогда получаем, что

$$3\rho_{ab}^2 - 5\rho_{ab} - 5 \geq (\rho_{ab} - 2)n \Rightarrow \frac{3\rho_{ab}^2 - 5\rho_{ab} - 5}{\rho_{ab} - 2} \geq n.$$

Понятно, что

$$3\rho_{ab} + 1 > \frac{3\rho_{ab}^2 - 5\rho_{ab} - 5}{\rho_{ab} - 2}.$$

А тогда получаем, что

$$3\rho_{ab} + 1 > n \Rightarrow \rho_{ab} > \frac{n-1}{3}.$$

В рамках этого подслучая уже вывели неравенство  $r \geq \rho_{ab}(n - r + 1)$ . Подставляя в него  $\rho_{ab} > \frac{n-1}{3}$  (это можно делать, поскольку неравенство  $n - r + 1 \geq 0$  выполняется, так как иначе выполнено  $r = n$ ,

что означает, что цикл  $T$  гамильтонов и подходит под то, что ищем), получаем, что

$$r > \frac{n-1}{3}(n-r+1).$$

Очевидно, что  $r \leq n$ . Тогда  $n-r+1 > 0$ . Если  $n-r+1 = 1$ , то  $r = n$ , что значит, что цикл  $T$  гамильтонов, что и нужно. Если  $n-r+1 = 2$ , то  $r = n-1$ , что значит, что цикл  $T$  содержит все вершины, кроме одной, то есть тоже подходит под то, что ищем. Если же  $n-r+1 \geq 3$ , то тогда  $r > \frac{n-1}{3}(n-r+1) \Rightarrow r > n-1$ , что только что разобрано.

**Подслучай 1б.** В цикле  $T$  есть вершина типа  $a$  или типа  $b$ .

Участком типа  $a$  называем такой подряд идущий набор вершин в направлении обхода цикла  $T$ , образованный всеми лежащими между вершинами типа  $a$  вершинами (крайние вершины участка — это вершины типа  $a$ ), который, во-первых, нельзя увеличить, а во-вторых, в котором нет вершин других типов (участок также может состоять из одной вершины). Аналогичное определение даём для участка типа  $b$  и участка типа  $ab$ . Рёбра цикла естественным образом разбиваются на 4 группы: рёбра в участках типа  $a$ , рёбра в участках типа  $b$ , рёбра в участках типа  $ab$  и рёбра между участками. Пусть  $\gamma_a$  — это количество участков типа  $a$ ,  $\gamma_b$  — это количество участков типа  $b$ ,  $\gamma_{ab}$  — это количество участков типа  $ab$ . Из формулировки подслучая ясно, что хотя бы 2 из 3-х чисел  $\rho_a, \rho_b, \rho_{ab}$  положительны (и соответственно, хотя бы 2 из 3-х чисел  $\gamma_a, \gamma_b, \gamma_{ab}$  положительны). Значит,  $\gamma_a + \gamma_b + \gamma_{ab} \geq 2$ . То есть цикл  $T$  не может быть целиком из одного участка.

Из замечания, сформулированного непосредственно перед подслучаем 1а, сразу следует, что между двумя разными участками не менее, чем  $n-r+1$  рёбер по обходу цикла. А также рёбер между двумя вершинами типа  $ab$  в участке типа  $ab$  тоже не менее, чем  $n-r+1$ . Рассмотрим все рёбра цикла  $T$ , не являющихся рёбрами в участках типа  $a$  или  $b$ . Для этого зафиксируем некоторое направление обхода цикла  $T$ . Обходя цикл  $T$  по этому направлению обхода, после окончания прохождения участка типа  $a$  или  $b$  следует не менее  $n-r+1$  междуучасточных рёбер, а также после посещения любой вершины типа  $ab$  следует не менее  $n-r+1$  междуучасточных рёбер или же рёбер участка типа  $ab$ . Таким образом, рёбер цикла  $T$ , не являющихся рёбрами в участках типа  $a$  или  $b$  не менее, чем  $(n-r+1)(\rho_{ab} + \gamma_a + \gamma_b)$ .

Рассмотрим любой участок типа  $a$ . Пусть в нём  $s$  вершин типа  $a$ . Тогда, если  $s \geq 2$ , то поскольку любая соседняя по обходу цикла вершина к вершине типа  $a$  не может быть вершиной типа  $a$  или  $b$ , то в участке хотя бы  $2s - 1$  рёбер, а если  $s = 1$ , то в участке хотя бы  $2s - 2$  рёбер, то есть для любого  $s$  в участке хотя бы  $2s - 2$  рёбер. Значит, всего внутриучасточных рёбер в участках типа  $a$  не менее, чем  $2\rho_a - 2\gamma_a$ . Аналогично, всего внутриучасточных рёбер в участках типа  $b$  не менее, чем  $2\rho_b - 2\gamma_b$ . Значит, всего внутриучасточных рёбер не менее, чем  $2(\rho_a + \rho_b) - 2(\gamma_a + \gamma_b)$ .

Итого, всего рёбер в цикле  $T$  не менее, чем  $(n - r + 1)(\gamma_a + \gamma_b + \rho_{ab}) + 2(\rho_a + \rho_b) - 2(\gamma_a + \gamma_b)$ . Поскольку в нём ровно  $r$  рёбер, то выполнено неравенство

$$\begin{aligned} r &\geq (n - r + 1)(\gamma_a + \gamma_b + \rho_{ab}) + 2(\rho_a + \rho_b) - 2(\gamma_a + \gamma_b) \\ &\geq (n - r - 2)(\gamma_a + \gamma_b + \rho_{ab}) + 2(\rho_a + \rho_b) + 3\rho_{ab}. \end{aligned}$$

Поскольку  $\gamma_a + \gamma_b + \gamma_{ab} \geq 2$  и очевидно, что  $\rho_{ab} \geq \gamma_{ab}$ , то тогда  $\gamma_a + \gamma_b + \rho_{ab} \geq 2$ . Также  $n - r - 2 \geq 0$ , поскольку иначе  $r = n$  или  $r = n - 1$  (тогда цикл  $T$  или гамильтонов, или содержит все вершины без одной, то есть подходит под то, что ищем). Из этого следует, что

$$r \geq 2(n - r - 2) + 2(\rho_a + \rho_b) + 3\rho_{ab} \Rightarrow 3r \geq 2(n - 2) + 2(\rho_a + \rho_b) + 3\rho_{ab}$$

$$\Rightarrow r \geq \frac{2}{3}(\rho_a + \rho_b) + \frac{2}{3}n - \frac{4}{3} + \rho_{ab}.$$

Вершина  $a$  соединена ровно с  $\rho_a + \rho_{ab}$  вершинами цикла  $T$  и может быть ещё соединена со всеми вершинами пути  $H$ , кроме себя, то есть она соединена не более, чем с  $n - r - 1 + \rho_a + \rho_{ab}$  вершинами. С другой стороны, её степень, по условию, не меньше, чем  $\frac{n+2}{3}$ . Значит, выполнено неравенство:  $\frac{n+2}{3} \leq n - r - 1 + \rho_a + \rho_{ab}$ . Аналогичное для вершины  $b$ , получаем, что  $\frac{n+2}{3} \leq n - r - 1 + \rho_b + \rho_{ab}$ . Значит,  $\frac{n+2}{3} \leq n - r - 1 + \min(\rho_a, \rho_b) + \rho_{ab}$ . Таким образом, выполнено неравенство:

$$r \leq \frac{2n - 5}{3} + \min(\rho_a, \rho_b) + \rho_{ab}.$$

Из этого и предыдущего неравенств следует, что

$$\begin{aligned} \frac{2n - 5}{3} + \min(\rho_a, \rho_b) + \rho_{ab} &\geq \frac{2}{3}(\rho_a + \rho_b) + \frac{2}{3}n - \frac{4}{3} + \rho_{ab} \\ \Rightarrow \min(\rho_a, \rho_b) &\geq \frac{2}{3}(\rho_a + \rho_b) + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Поскольку  $\frac{2}{3}(\rho_a + \rho_b) \geq \frac{4}{3} \min(\rho_a, \rho_b)$ , то получается, что

$$\min(\rho_a, \rho_b) \geq \frac{4}{3} \min(\rho_a, \rho_b) + \frac{1}{3} \Rightarrow 0 \geq \frac{1}{3} \min(\rho_a, \rho_b) + \frac{1}{3}.$$

Это невозможно, противоречие.

**2 случай:** Не существует двух таких разных вершин цикла  $T$ , что одна соединена с  $a$ , а другая — с  $b$ .

Это значит, что или из  $a$ , или из  $b$  в цикл  $T$  выходит не более 1 ребра (потому что в противном случае из  $a$  и из  $b$  выходит в цикл  $T$  минимум по 2 ребра, и тогда  $a$  и  $b$  соединены с двумя разными вершинами цикла  $T$ ). Не теряя общности, пусть из  $a$  в цикл  $T$  выходит не более 1 ребра. Поскольку  $d_G(a) \geq \frac{n}{3}$ , то тогда из  $a$  в путь  $H$  выходит не менее, чем  $\frac{n}{3} - 1$  рёбер. Тогда в пути  $H$ , включая  $a$ , не менее, чем  $\frac{n}{3} - 1 + 1 = \frac{n}{3}$  вершин. В пути  $H$  ровно  $n - r$  вершин, таким образом,

$$n - r \geq \frac{n}{3} \Rightarrow r \leq \frac{2n}{3}. \quad (2)$$

**Утверждение 3.** а) Любой конец пути  $H$  имеет не более, чем  $\frac{r}{3}$  соседей среди вершин цикла  $T$ .

б) Если в графе  $G(H)$  есть гамильтонов цикл, то любая вершина графа  $G(H)$  имеет не более, чем  $\frac{r}{3}$  соседей среди вершин цикла  $T$ .

**Доказательство.** а) Сначала докажем для вершины  $a$ . От противного, пусть из неё в цикл  $T$  ведёт больше, чем  $\frac{r}{3}$  рёбер. Поскольку из  $a$  в цикл  $T$  выходит не более 1 ребра, то получаем, что  $1 > \frac{r}{3} \Rightarrow r < 3$ . По утверждению 2,  $r \geq \frac{n}{2}$ . Значит,  $3 > \frac{n}{2} \Rightarrow n < 6$ , противоречие с (1).

Теперь докажем для вершины  $b$ . Посмотрим на  $k_b$  соседей  $b$  в цикле  $T$  (сохраняя терминологию, называем их *вершинами типа  $b$* ). Заметим, что вершины типа  $b$  не могут быть соседями в порядке обхода цикла: иначе цикл  $T$  можно легко увеличить за счёт вершины  $b$ , а оставшиеся вершины будут образовывать путь (это было продемонстрировано в рис. 8). Пусть есть две вершины  $b_1$  и  $b_3$  типа  $b$ , которые находятся друг от друга через 1 вершину (назовём её  $b_2$ ) в порядке обхода цикла  $T$ . Только что доказали, что  $bb_2 \notin E(G)$ . Заметим, что  $b_2$  не соединена ни с одной из вершин пути  $H$  (если соединена, то образуется цикл, по размеру больший, чем цикл  $T$ , и все вершины, не входящие в цикл, образуют путь — рис. 10). Значит, все соседи  $b_2$  находятся в цикле  $T$ . Заметим, что если два соседа  $b_2$  являются соседними в порядке




Рис. 10.  $b_2$  не может быть соединена с какой-либо вершиной пути  $H$ , иначе образуется цикл (отмечен жирным), существование которого противоречит выбору цикла  $T$ .

обхода цикла  $T$ , то вершину  $b_2$  можно 'вставить' между этими соседями, и тогда образуется цикл, содержащий все вершины  $T$  и вершину  $b$  (то есть по размеру он больше цикла  $T$ ), таким образом, все не входящие в цикл вершины образуют путь (рис. 11). Значит, никакие два соседа  $b_2$  не являются соседними в порядке обхода цикла  $T$ . В цикле  $T$ , кроме  $b_2$  есть  $r - 1$  вершин, то есть получается, что  $b_2$  соединена не более, чем с  $\lceil \frac{r-1}{2} \rceil$  вершинами. Таким образом, так как  $d_G(b_2) \geq \frac{n}{3}$ , получается, что  $\lceil \frac{r-1}{2} \rceil \geq \frac{n}{3} \Rightarrow \frac{r}{2} \geq \frac{n}{3} \Rightarrow r \geq \frac{2n}{3}$ . Из (2) получаем, что  $r = \frac{2n}{3}$ .

Поскольку  $r = \frac{2n}{3}$ , то в пути  $H$  ровно  $n - r = \frac{n}{3}$  рёбер. Тогда в пути  $H$ , помимо вершины  $a$ , всего  $\frac{n}{3} - 1$  вершин. Значит, поскольку  $d_G(a) \geq \frac{n}{3}$ , то вершина  $a$  имеет хотя бы одного соседа среди вершин цикла  $T$ . Назовём этого соседа  $a_1$ . Тогда  $a_1 \neq b_1$  или же  $a_1 \neq b_3$ , не теряя общности, предположим первое. Тогда  $a_1$  и  $b_1$  - такие 2 различные вершины цикла  $T$ , что  $a_1$  соединена с  $a$ , а  $b_1$  соединена с  $b$ . Противоречие с формулировкой 2-го случая, в рамках которого находимся.

Значит, нет двух соседей  $b$ , которые являются друг другу соседями или находятся друг от друга через 1 вершину в порядке обхода цикла  $T$ . Но если бы вершина  $b$  имела больше, чем  $\frac{n}{3}$  соседей среди вершин цикла  $T$ , то тогда такие соседи непременно бы нашлись. Противоречие.

б) Если вершины пути  $H$  образуют гамильтонов цикл, то любая вершина пути  $H$  является концом гамильтонова пути в графе  $G(V(H))$ .




Рис. 11. Если  $b_2$  соединена с двумя подряд идущими в порядке обхода цикла  $T$  вершинами, то найдётся цикл (отмечен жирным), существование которого противоречит выбору цикла  $T$ .

Применяя утверждение 3, пункт а) к этой вершине и к этому гамильтонову пути, получаем нужное.  $\square$




Рис. 12. Путь  $H$  с вершиной  $c$  образуют такой цикл (отмечен жирным), что не входящие в него вершины образуют путь.



**Утверждение 4.** Вершины пути  $H$  образуют цикл.

**Доказательство.** Разберём 2 случая.

**Случай а.** Из  $a$  и из  $b$  в цикл  $T$  выходит не менее, чем по 1 ребру.

Тогда, поскольку мы находимся в условиях случая 2: из  $a$  и из  $b$  выходит в цикл  $T$  ровно по 1 ребру, причём эти 2 ребра смежны, назовём их общий конец через  $c$ . Рассмотрим подграф  $G(H)$ . Поскольку из  $a$  и из  $b$  в цикл  $T$  выходит ровно по 1 ребру, то  $d_{G(H)}(a) \geq \frac{n}{3} - 1$ ,  $d_{G(H)}(b) \geq \frac{n}{3} - 1$ . В графе  $G(H)$  есть гамильтонов путь  $H$ . Тогда применим лемму 1 к пути  $H$ , в котором  $n - r$  вершин: если  $d_{G(H)}(a) + d_{G(H)}(b) \geq n - r$ , то в графе  $G(H)$  есть гамильтонов цикл (что и хотим). В противном случае:  $n - r > d_{G(H)}(a) + d_{G(H)}(b) \geq \frac{n}{3} - 1 + \frac{n}{3} - 1 = \frac{2n}{3} - 2 \Rightarrow r < \frac{n}{3} + 2$ . Заметим, что путь  $H$  и вершина  $c$  образуют цикл размера  $n - r + 1$ , причём такой, что не входящие в него вершины образуют путь (рис. 12). Тогда, по определению  $r$ , получаем:  $r \geq n - r + 1 \Rightarrow r \geq \frac{n+1}{2}$ . Если  $r > \frac{n+1}{2}$ , то  $r \geq \frac{n}{2} + 1$ . Поскольку  $r < \frac{n}{3} + 2$ , то получаем  $\frac{n}{3} + 2 > \frac{n}{2} + 1 \Rightarrow n < 6$ , противоречие с (1). Если же  $r = \frac{n+1}{2}$ , то во-первых,  $n$  нечётно, а во-вторых, поскольку  $r < \frac{n}{3} + 2$ , получаем  $\frac{n}{3} + 2 > \frac{n+1}{2} \Rightarrow n < 9$ . Поскольку  $n$  нечётно, и выполнено (1), то  $n = 7$ ,  $r = \frac{n+1}{2} = 4$ . Из предыдущих рассуждений следует, что в графе есть два цикла размера 4 (назовём их  $T_1$  и  $T_2$ ), имеющих общую вершину  $c$ , причём нет цикла длины 5 такого, что оставшиеся 2 вершины соединены (впрочем, также нет цикла длины 5 такого, что оставшиеся 2 вершины не соединены, иначе это и есть тот цикл, существование которого пытаемся доказать). То есть в графе нет цикла длины 5. Заметим, что при удалении вершины  $c$  из двусвязности граф остаётся связным, значит, есть ребро  $c_1c_2 \in E(G)$  для неких  $c_1$  и  $c_2$  из разных циклов  $T_1$  и  $T_2$  соответственно (рис. 13). Поскольку  $T_1$  и  $T_2$  — циклы длины 4, то есть пути, длина обоих не менее 2, от  $c_1$  и  $c_2$  до  $c$ , проходящие по рёбрам циклов  $T_1$  и  $T_2$  соответственно. Конкатенация этих путей и ребро  $c_1c_2$  образуют цикл длины не менее 5, противоречие. Поскольку в графе нет цикла длины 5, то этот цикл длины 6 или 7, но тогда он гамильтонов или он содержит все вершины, кроме одной, то есть в любом случае подходит под описание цикла из формулировки теоремы.

**Случай б.** В паре  $(a, b)$  есть вершина, из которой в цикл  $T$  не выходит рёбер.




Рис. 13. Разбор случая  $n = 7$ .

Не теряя общности, пусть из  $a$  в цикл  $T$  не выходит рёбер. Сохраняем предыдущие обозначения: из  $b$  в цикл  $T$  выходит  $k_b$  рёбер. Рассмотрим подграф  $G(H)$ . Поскольку из  $a$  в цикл  $T$  не выходит рёбер, а из  $b$  в цикл  $T$  выходит ровно  $k_b$  рёбер, то  $d_{G(H)}(a) \geq \frac{n}{3}$ ,  $d_{G(H)}(b) \geq \frac{n}{3} - k_b$ . В графе  $G(H)$  есть гамильтонов путь  $H$ . Тогда применим лемму 1 к пути  $H$ , в котором  $n - r$  вершин: если  $d_{G(H)}(a) + d_{G(H)}(b) \geq n - r$ , то в графе  $G(H)$  есть гамильтонов цикл (что и хотим). В противном случае:  $n - r > d_{G(H)}(a) + d_{G(H)}(b) \geq \frac{n}{3} + \frac{n}{3} - k_b = \frac{2n}{3} - k_b \Rightarrow k_b > r - \frac{n}{3}$ . При этом по утверждению 3, пункт а) выполнено неравенство  $k_b \leq \frac{r}{3}$ . Таким образом, вывели 2 неравенства:  $k_b \leq \frac{r}{3}$  и  $k_b > r - \frac{n}{3} \Rightarrow \frac{r}{3} > r - \frac{n}{3} \Rightarrow n > 2r$ . Противоречие с утверждением 2.  $\square$

Итак, вершины пути  $H$  образуют цикл. Отныне будем называть  $H$  циклом.

Пусть  $p$  и  $q$  — такие две вершины  $H$ , что между ними кратчайший путь по рёбрам цикла  $H$  среди тех пар вершин из  $H$ , у которых есть различные соседи в цикле  $T$  (такие пары вершин найдутся, поскольку граф  $G$  двусвязный). Пусть  $p_0$  и  $q_0$  — соседи  $p$  и  $q$  соответственно среди

вершин цикла  $T$  (такие, что  $p_0 \neq q_0$ ). Пусть  $V_H$  — множество вершин  $H$ . Тогда все вершины  $V_H$  — это объединение  $V_H = V_{H_1} \cup V_{H_2} \cup \{p\} \cup \{q\}$ , где  $H_1$  и  $H_2$  — два участка цикла  $H$ , на которые этот цикл делят вершины  $p$  и  $q$  (рис. 14), а  $V_{H_1}$  и  $V_{H_2}$  — это множество вершин  $H_1$  и  $H_2$  соответственно. Не теряя общности предположим, что  $|V_{H_1}| \leq |V_{H_2}|$ . Заметим, что для любой вершины  $e \in V_{H_1}$  выполнено  $d_{G(V_H)}(e) \geq \frac{n}{3}$ . Действительно, иначе, поскольку  $d_G(e) \geq \frac{n}{3}$ , то у  $e$  есть сосед среди вершин  $T$  (обозначим его  $e_1$ ). Тогда  $e_1 \neq p_0$  или же  $e_1 \neq q_0$ , не теряя общности, предположим первое. Тогда у  $e$  и  $p$  есть два различных соседа в  $T$ , значит, путь между  $p$  и  $q$  — это не кратчайший путь по рёбрам цикла  $H$  среди всех пар вершин  $H$ , у которых есть различные соседи в цикле  $T$ , потому что путь по рёбрам цикла  $H$  между  $e$  и  $p$  короче.




Рис. 14. Разбиение цикла  $H$  и его соединение по рёбрам  $pp_0$  и  $qq_0$  с циклом  $T$ .

**Утверждение 5.** В графе  $G(V_H)$  существует такой гамильтонов путь, что его концы — это вершины  $p$  и  $q$ .

**Доказательство.** Рассмотрим самый длинный путь с концами  $p$  и  $q$  (назовём его  $L_2$  и пусть в нём  $\eta$  вершин) среди всех таких, для

которых если какая-то вершина  $d$  не лежит в этом пути, то тогда  $d_{G(V_H)}(d) \geq \frac{n}{3}$ , причём все вершины  $H$ , не лежащие в этом пути, образуют путь (назовём его концы  $p_1$  и  $q_1$  и назовём этот путь  $L_1$ ). Такой путь  $L_2$  существует, поскольку из ранее доказанного подойдёт путь между  $p$  и  $q$ , проходящий по участку цикла  $H_2$  (в нём не менее  $\frac{n-r}{2} + 1$  вершин, значит,  $\eta \geq \frac{n-r}{2} + 1$ ). Предположим противное: пусть  $L_2$  не гамильтонов. Тогда в пути  $L_1$  ровно  $n - r - \eta \geq 1$  вершин. Поскольку из условия на  $L_2$  выполнено  $d_{G(V_H)}(p_1) \geq \frac{n}{3}$ , то есть не менее  $\frac{n}{3} - (n - r - \eta - 1) = r + \eta + 1 - \frac{2n}{3}$  соседей вершины  $p_1$  среди вершин пути  $L_2$ . Заметим, что соседи вершины  $p_1$  не могут быть соседями в порядке обхода пути  $L_2$  (иначе вершину  $p_1$  можно 'вставить' между этими соседями в путь  $L_2$  (рис. 15) — тогда путь  $L_2$  будет длиннее, а все остальные вершины образуют путь и всё ещё их степени в  $G(V_H)$  не менее, чем  $\frac{n}{3}$ , противоречие с максимальностью  $L_2$ ). Таким образом,  $\eta \geq 2(r + \eta + 1 - \frac{2n}{3}) - 1 \Rightarrow \eta \leq \frac{4n}{3} - 2r - 1$ .




Рис. 15. Разбиение  $H$  на 2 пути:  $L_1$  и  $L_2$ . Демонстрация того, что  $p_1$  не может иметь двух подряд идущих в порядке обхода пути  $L_2$  соседей.

Докажем, что вершины  $L_1$  образуют цикл. От противного, пусть они не образуют цикл. Разберём сначала случай, когда в  $L_1$  хотя бы 3 вершины. Поскольку в нём ровно  $n - r - \eta$  вершин и  $L_1$  — это путь, то по лемме 1 выполнено  $d_{G(L_1)}(p_1) + d_{G(L_1)}(q_1) < n - r - \eta$ , не теряя общности,  $d_{G(L_1)}(p_1) < \frac{n-r-\eta}{2}$ . Тогда есть не менее  $\frac{n}{3} - \frac{n-r-\eta-1}{2} = \frac{r+\eta+1}{2} - \frac{n}{6}$  соседей вершины  $q_1$  среди вершин пути  $L_2$ . Аналогично тому, что выше, соседи  $q_1$  не могут быть соседями в порядке обхода

пути  $L_2$ , и мы получаем:  $\eta \geq 2\left(\frac{r+\eta+1}{2} - \frac{n}{6}\right) - 1 \Rightarrow \eta \geq r + \eta - \frac{n}{3} \Rightarrow \frac{n}{3} \geq r$ . Противоречие с утверждением 2.

Теперь разберём случай, когда  $L_1$  состоит из одной или двух вершин. Тогда  $\eta \geq n - r - 2$ , и поскольку  $\eta \leq \frac{4n}{3} - 2r - 1$ , то получаем  $\frac{4n}{3} - 2r - 1 \geq n - r - 2 \Rightarrow r \leq \frac{n}{3} + 1$ . Но по утверждению 2,  $r \geq \frac{n}{2}$ . Тогда  $\frac{n}{3} + 1 \geq \frac{n}{2} \Rightarrow n \leq 6$ . Тогда из (1) получаем, что  $n = 6$ , что означает, что все неравенства в этом абзаце превращаются в равенства, таким образом,  $n = 6, r = \frac{n}{2} = 3, \eta = n - r - 2 = 1$ . Но  $\eta \geq 2$ , так как путь  $L_2$  содержит вершины  $p$  и  $q$ . Противоречие.

Итак, вершины  $L_1$  образуют цикл, и отныне мы будем называть  $L_1$  циклом.




Рис. 16. Для каждого соседа  $p_1$  из пути  $L_2$  отмечаем (на рисунке – более жирным) соседа и вершину, идущую через один.

Теперь докажем, что найдутся две такие вершины пути  $L_2$ , что они, во-первых, или соседи, или идут через 1 в порядке обхода пути  $L_2$ , а во-вторых, одна из них соединена с  $p_1$ , а вторая – с  $q_1$ . От противного, пусть таких нет. Зафиксируем какое-то направление обхода пути  $L_2$  (например, от  $p$  до  $q$ ). Рассмотрим всех соседей  $p_1$  среди вершин пути  $L_2$ . Напомним, что их хотя бы  $r + \eta + 1 - \frac{2n}{3}$ . Для каждого из этих соседей *отметим* две вершины, следующие за ним в соответствии с

зафиксированным направлением обхода пути  $L_2$  (то есть отмечаем соседа и вершину, идущую через один, рис. 16). Поскольку уже доказали (этому был посвящён рис. 15), что все соседи вершины  $p_1$  не являются соседями в порядке обхода пути  $L_2$ , то никакую вершину не отметили дважды, значит, отметили не менее  $2(r + \eta + 1 - \frac{2n}{3} - 1)$  вершин (для  $q$  не отмечаем ни одной вершины, то есть теряем две, а для соседа  $q$  в порядке обхода пути  $L_2$  отмечаем только одну, то есть теряем одну. Значит, всего теряем не более, чем две, так как  $q$  и этот сосед  $q$  не могут быть одновременно соседями вершины  $p_1$ ). Поскольку предположили противное, то все соседи  $q_1$  в пути  $L_2$  (а их тоже хотя бы  $r + \eta + 1 - \frac{2n}{3}$ ) не могут быть отмеченными. Таким образом,

$$\begin{aligned} \eta &\geq r + \eta + 1 - \frac{2n}{3} + 2(r + \eta + 1 - \frac{2n}{3} - 1) \\ \Rightarrow 0 &\geq r + 1 - \frac{2n}{3} + 2r + 2\eta - \frac{4n}{3} \Rightarrow 2n \geq 3r + 2\eta + 1. \end{aligned}$$

Поскольку  $\eta \geq \frac{n-r}{2} + 1$ , то получаем  $2n \geq 3r + n - r + 2 + 1 \Rightarrow n \geq 2r + 3 \Rightarrow r < \frac{n}{2}$ . Противоречие с утверждением 2.




Рис. 17. Найдётся гамильтонов путь в  $V_H$  с концами  $p$  и  $q$ , если  $y_1$  и  $y_2$  – соседи в порядке обхода пути  $L_2$ .

Итак, нашли две такие вершины пути  $L_2$ , что они, во-первых, или соседи, или идут через 1 в порядке обхода пути  $L_2$ , а во-вторых, одна из них соединена с  $p_1$ , а вторая — с  $q_1$ . Назовём их  $y_1$  и  $y_2$  (пусть  $y_1$  будет ближе в порядке обхода пути  $L_2$  к вершине  $p$ , а  $y_2$  — к вершине  $q$  и не теряя общности пусть  $y_1$  — сосед  $p_1$ , а  $y_2$  — сосед  $q_1$ ). Заметим, что если  $y_1$  и  $y_2$  — соседи в порядке обхода пути  $L_2$ , то мы нашли гамильтонов путь в  $V_H$  с концами  $p$  и  $q$  (рис. 17).

Значит,  $y_1$  и  $y_2$  идут через один в порядке обхода пути  $L_2$ , тогда назовём вершину между ними в порядке обхода пути  $L_2$  через  $z$ . Поскольку  $z$  — сосед в пути  $L_2$  как вершины  $y_1$ , так и вершины  $y_2$ , то, как отмечали ранее (этому был посвящён рис. 15),  $z$  не может быть соседом  $p_1$  или  $q_1$ . Допустим,  $z$  — сосед какой-то другой вершины цикла  $L_1$ . Тогда заметим, что мы нашли путь с концами  $p$  и  $q$ , содержащий весь путь  $L_2$  и ещё какие-то вершины (он идёт по  $L_2$  от  $p$  до  $z$ , затем заходит в цикл  $L_1$ , доходит по рёбрам цикла  $L_1$  до вершины  $q_1$ , переходит по ребру к вершине  $y_2$  и дальше идёт по рёбрам пути  $L_2$  к вершине  $q$ , рис. 18), что противоречит выбору  $L_2$ . Значит, вершина  $z$  не имеет соседей среди цикла  $L_1$ . Заметим, что если  $z$  имеет двух подряд идущих соседей в порядке обхода пути  $L_2$ , то мы нашли гамильтонов путь в  $V_H$  с концами  $p$  и  $q$ , он выглядит так: идём от вершины  $p$  к вершине  $y_1$  по рёбрам  $L_2$ , идём по ребру  $y_1p_1$ , проходим по рёбрам пути  $L_1$  к вершине  $q_1$ , проходим по ребру  $q_1$  к вершине  $y_2$ , а затем идём по рёбрам пути  $L_2$  к вершине  $q$ , при этом вставляем куда-то в этот путь вершину  $z$  между этими соседями (рис. 19). Таким образом, вершина  $z$  не имеет двух подряд идущих в порядке обхода пути  $L_2$  соседей среди вершин пути  $L_2$ . Пусть в участке пути  $L_2$  от вершины  $p$  до вершины  $y_1$  ровно  $\tau_1$  вершин, а в участке пути от вершины  $y_2$  до вершины  $q$  ровно  $\tau_2$  вершин. Тогда  $\tau_1 + \tau_2 = \eta - 1$ . Поскольку  $z$  не имеет двух подряд идущих в порядке обхода пути  $L_2$  соседей среди вершин пути  $L_2$ , то на первом участке она имеет не более, чем  $\frac{\tau_1+1}{2}$  соседей, а на втором — не более, чем  $\frac{\tau_2+1}{2}$ , то есть всего не более, чем  $\frac{\tau_1+1}{2} + \frac{\tau_2+1}{2} = 1 + \frac{\tau_1+\tau_2}{2} = 1 + \frac{\eta-1}{2} = \frac{\eta+1}{2}$  соседей.

По утверждению 3, пункт б) вершина  $z$  имеет не более, чем  $\frac{r}{3}$  соседей в цикле  $T$ . Применяя это соображение, получаем, что  $d_G(z) \leq \frac{\eta+1}{2} + \frac{r}{3}$ . Поскольку  $d_G(z) \geq \frac{n+2}{3}$ , получаем, что  $\frac{n+2}{3} \leq \frac{\eta+1}{2} + \frac{r}{3} \Rightarrow 2n + 4 \leq 3\eta + 3 + 2r \Rightarrow \eta \geq \frac{2n}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2r}{3}$ . Поскольку  $\eta \leq \frac{4n}{3} - 2r - 1$ , то  $\frac{4n}{3} - 2r - 1 \geq \frac{2n}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2r}{3} \Rightarrow \frac{2n}{3} - \frac{4}{3} \geq \frac{4r}{3} \Rightarrow \frac{n}{2} > r$ . Противоречие с утверждением 2.  $\square$




Рис. 18. Если у  $z$  есть сосед какой-то вершины цикла  $L_1$ , то найдётся путь (отмечен жирным) от  $p$  до  $q$ , существование которого противоречит выбору  $L_2$ .

Итак, обозначим гамильтонов путь в графе  $G(V_H)$  с концами  $p$  и  $q$  через  $H_0$ . Тогда образуется цикл такой: путь  $H_0$ , рёбра  $pp_0$  и  $qq_0$  и ещё по рёбрам цикла (по большей половине цикла  $T$ ) между  $p_0$  и  $q_0$  (рис. 20). Длина у такого цикла — это не менее, чем  $\frac{r}{2} + 2 + n - r - 1 = n - \frac{r}{2} + 1$  (2 рёбра  $pp_0, qq_0$ , большая половина цикла  $T$  — это не менее  $\frac{r}{2} + 2$  рёбер и гамильтонов путь в графе  $G(V_H)$ ; поскольку там ровно  $n - r$  вершин, то этот в этом пути будет  $n - r - 1$  рёбер). Заметим, что это такой цикл, что все остальные вершины, не входящие в этот цикл, — это одна из половин цикла  $T$ , то есть они образуют путь. Тогда, из выбора цикла  $T$ , должно быть выполнено:  $r \geq n - \frac{r}{2} + 1 \Rightarrow \frac{3r}{2} > n \Rightarrow r > \frac{2n}{3}$ . Противоречие с (2). Теорема доказана.






Рис. 19. Если  $z$  имеет двух подряд идущих соседей в порядке обхода пути  $L_2$ , то есть гамильтонов путь в  $V_H$  (отмечен жирным).




Рис. 20. Из части цикла  $T$  и пути  $H_0$  получается цикл (отмечен жирным), существование которого противоречит выбору цикла  $T$ .

### 3. Точность оценки

**Утверждение.** Оценка  $\frac{n+2}{3}$  точна. Точнее, для любого  $n \geq 8$  и для любого  $2 < \nu < \frac{n+2}{3}$  существует такой двусвязный граф  $G$ , что  $v(G) =$

$n$  и  $\delta(G) = \nu$ , и в котором нет такого цикла, что все не входящие в него вершины независимы.

**Доказательство.**




Рис. 21. Пример для  $n = 8$ ,  $\nu = 3$ .

Возьмём какие-то 2 вершины и назовём их  $f_1$  и  $f_2$ , а остальные вершины поделим на 3 группы: в первых двух группах будет ровно по  $\nu - 1$  вершин (назовём их  $A_1$  и  $A_2$ ), а в третьей будет  $n - 2\nu$  вершин (назовём её  $A_3$ ). Рёбра в этом графе будут такие: любые две вершины, лежащие в одной группе, соединены друг с другом, любые две вершины, лежащие в разных группах, не соединены, а вершины  $f_1$  и  $f_2$  соединены со всеми, но не друг с другом (рис. 21). Заметим, что  $\delta(G) = \nu$ , поскольку если вершина лежит в  $A_1$  или  $A_2$ , то её степень ровно  $\nu$ , степени вершин  $f_1$  и  $f_2$  равны  $n - 2 \geq \nu$  (так как  $n \geq 3$ , то  $n - 2 \geq \frac{n}{3} > \nu$ ) а степень любой вершины в  $A_3$  равна  $n - 2\nu + 1 \geq \nu$ . Теперь докажем, что граф двусвязный. Действительно, при удалении любой (кроме  $f_1$ ) вершины любая оставшаяся вершина соединена с  $f_1$  ( $f_2$  же соединена с какой-то вершиной из  $A_1$  или  $A_2$ , которая в свою очередь соединена с  $f_1$ ), таким образом граф без удалённой вершины связный. Если же удалена вершина  $f_1$ , то любая оставшаяся вершина соединена с  $f_2$ , то есть оставшийся граф связный. Осталось доказать, что в нём нет такого цикла, что оставшиеся вершины независимы. От противного, пусть такой цикл есть. Тогда заметим, что он должен в себе содержать какие-то вершины из всех групп  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  (иначе какая-то вся группа не вошла в цикл, а в любой группе есть рёбра, поскольку в  $A_1$  и  $A_2$  по  $\nu - 1 > 1$  вершин, а в  $A_3$  ровно  $n - 2\nu > 1$  вершин).

Начнём проход рёбер цикла, стартуя с какой-то вершины цикла из  $A_1$ . Не теряя общности, проходя по рёбрам цикла, в какой-то момент мы окажемся в вершине из  $A_2$ , потом в какой-то момент в вершине из  $A_3$ , а затем вернёмся в изначальное положение. При переходе из группы  $A_i$  в группу  $A_j$  для  $i \neq j$  цикл обязан посетить одну из вершин  $f_1, f_2$ . Но этих переходов между группами хотя бы 3, то есть какую-то из вершин  $f_1, f_2$  цикл посетил дважды. Противоречие.  $\square$

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. A. Bondy, U. S. R. Murty, *Graph Theory With Applications*. Elsevier Science, 1976.
2. R. Diestel, *Graph Theory*. Springer, 1997-2016 (издания 1-5).
3. с N. Linial, *A lower bound on the circumference of a graph*. — *Discrete Math.* **15** (1976), 297–300.
4. C. Thomassen, *A theorem on paths in planar graphs*. — *J. Graph Theory* **7** (1983), 169–176.

Karol' N. A. Criterion for the existence of such a cycle that vertices beyond this cycle are independent.

This paper contains a criterion for the existence of such a cycle that the vertices beyond this cycle are independent in terms of minimum vertex degree. More specifically, if  $G$  is a 2-connected graph,  $v(G) = n$  and  $\delta(G) \geq \frac{n+2}{3}$ , then  $G$  has a cycle such that vertices beyond this cycle are independent.

РЭШ

*E-mail*: kolya.karol.99@mail.ru

Поступило 1 ноября 2020 г.